



NARODOWY INSTYTUT
GERIATRII, REUMATOLOGII
I REHABILITACJI
IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHER

Nazwa i adres zakładu pracy: **Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher**
ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa

Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy

Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy			Nr karty: COVID-19/NIGRIR/2020
			Data opracowania/aktualizacji: 08/2020
			Liczba osób: Zgodnie z rejestrem szkoleń bhp i zapoznaniem z oceną ryzyka zawodowego
Nazwa stanowiska pracy	Dot. wszystkich pracowników zatrudnionych NIGRIR		
Stosowane na danym stanowisku maszyny i inne urządzenia, narzędzia i materiały: zgodnie z wykazem indywidualnej karty oceny ryzyka danego stanowiska oraz wykazem sprzętu danej jednostki. Dla wszystkich: płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni	Wyszczególnienie zadań wykonywanych na stanowisku pracy: ze względu na występowanie nowego zagrożenia w postaci wirusa SARS_CoV-2 ocena ryzyka dotyczy wszystkich pracowników, niezależnie od zajmowanego stanowiska: 1) pracownicy administracyjno-biurowi, techniczni i inni przebywający poza strefami hospitalizacji pacjentów zarażonych Covid-Sars -CoV2 2) pracownicy o stanowiskach medycznych i technicznych przebywający w strefach hospitalizacji pacjentów zarażonych Covid-Sars -CoV2 jak również w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobą podejrzaną o zarażenie Covid-Sars-CoV2	Stosowane na stanowisku środki ochrony zbiorowej i indywidualnej: 1) maski ochronne (fizycznie zakrywające nos i usta), maski chirurgiczne, przyłbice, płyny do dezynfekcji/alternatywnie mydło z płynem 2) uniform medyczny jednoczęściowy lub dwuczęściowy zgodnie z tabelą przydziału - żakiet/marynarka/fartuch/spodnie/spódnica, obuwie robocze, rękawiczki jednorazowe, półmaska, przyłbica poliwęglanowa lub okulary ochronne. W przypadku bezpośredniego kontaktu z osobą z podejrzeniem lub z potwierdzonym Covid-19 Fartuch jednorazowy - barierowy/alternatywnie kombinezon w strefie czerwonej, maska z filtrem FFP2/3 /alternatywnie maska chirurgiczna z przyłbicą lub gogle	Dokumenty odniesienia: PN-N-18002 przepisy prawne instrukcje procedury

Lp.	Zagrożenia	Źródło zagrożenia	Możliwe skutki zagrożenia	Stopień szkód	Prawdopodobieństwo szkód	Ryzyko	Środki ochrony przed zagrożeniami
Zagrożenia biologiczne - szkodliwy czynnik biologiczny przynależny do 3 zagrożenia							
1	Wirus SARS_CoV-2	bezpośredni kontakt z osobą chorą - pacjentem, jego osobą towarzyszącą lub współpracownikiem z zakładu pracy. Przebywanie w tym samym pomieszczeniu, droga kropelkowa, kontakt z wydzieloną osobą chorej poprzez kontakt bezpośredni lub pośredni	Covid -19 (ostra choroba zakaźna układu oddechowego), ból gardła, kaszel, katar, gorączka, brak smaku, węchu, ciężkie zapalenie płuc, problemy z oddychaniem, a nawet w skrajnych przypadkach śmierć oraz objawy które nie zostały jeszcze w pełni zidentyfikowane	duża	mało prawdopodobne (przy zastosowaniu działań zapobiegawczych)	średnie/dopu szcz.	a) stosowanie procedur bezpieczeństwa, przestrzeganie reżimu higieniczno-sanitarnego, b) stosowanie środków ochrony indywidualnej, c) właściwa organizacja stanowisk pracy w zależności od wystąpienia zagrożenia-Covid-19, d) ograniczanie kontaktu bezpośredniego z innymi pracownikami, współpracownikami, e) ograniczenie do niezbędnego minimum wstępu do placówek Magodent u przez osoby postronne f) zachowywanie dystansu społecznego, g) dezynfekcja powierzchni dotykowych środkami dezynfekującymi na bazie alkoholu, h) przestrzeganie zasad czystości i higieny w miejscu pracy.

	kontakt z wirusem SARS-CoV-2 w sytuacji: zdejmowania zanieczyszczonych (skażonych) środków ochrony indywidualnej - dotknięcie zewnętrznej (skażonej) części środków ochrony indywidualnej	niezabezpieczoną ręką, lub inną częścią ciała lub stroju	j.w. (dot. pracowników medycznych - mających kontakt z pacjentem ze zdiagnozowanym zakażeniem)			
	Uszkodzenia zewnętrznych w strefie czerwonej. Uszkodzenia fartucha/kombinezonu lub rękawic wewn. w strefie czerwonej. Roszczenia się maski ochronnej/przybicy/gogli.	Covid -19 (ostra choroba zakaźna układu oddechowego), ból gardła, kaszel, katar, gorączka, brak smaku, węchu, ciężkie zapalenie płuc, problemy z oddychaniem, a nawet w skrajnych przypadkach śmierć oraz objawy które nie zostały jeszcze w pełni zidentyfikowane	średnia	prawdopodobne	średnie/dopu szcz.	a) stosowanie procedur epidemiologicznych przestrzeganie reżimu higieniczno-sanitarnego, b) właściwa organizacja stanowisk pracy w zależności od wystąpienia zagrożenia-Covid-19, c) szczepienia ochronne

Zagrożenia chemiczne							
2	Czynniki chemiczne	Preparaty chemiczne stosowane w walce z SARS_CoV-2, stosowane podczas dezynfekcji powierzchni i rąk	podrażnienia skóry, oczu, dróg oddechowych, zatrucia	średnia	mało prawdopodobne	małe/dopuszczalne	a) zapoznanie z kartami charakterystyk stosowanych do dezynfekcji mieszanin chemicznych oraz przestrzeganie zasad zawartych w karcie, b) zapewnienie wentylacji w pomieszczeniach w których dokonuje się dezynfekcji
Zagrożenia psychospołeczne							
3	Obciążenie psychofizyczne,	izolacja społeczna, lęk i obawa o własne życie i zdrowie, spowodowane obecnością wirusa SARS_CoV-2 w przestrzeni publicznej	zmęczenie i zmniejszenie wydolności umysłowej oraz psychicznej, nerwica, brak motywacji do pracy, zmniejszony psychosomatyczny	średnia	prawdopodobne	średnie/dopuszczalne	a) zapewnienie właściwej atmosfery w pracy/ b) szkolenia wewnątrzzakładowe - procedury/instrukcje dot. SARS_CoV-2 c) zapewnienie pomocy psychologicznej - na indywidualny wniosek izolowanego pracownika

Opinował:	Wojtkowski Andrzej
Zweryfikował:	Jolanta Sochnacka
Zatwierdził:	Dyrektor Dr n. med. Marek Tombariewicz
Warszawa, dnia	17.09.2020

4100581P

SPECJALISTA ds. PIĘTOSIOWANIA
EPIDEMIOLOGICZNEGO
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii
i Rehabilitacji w Warszawie
mgr Jolanta Sochnacka

DYREKTOR

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii
i Rehabilitacji w Warszawie

Dr n. med. Marek Tombariewicz